

Auswertungsanleitung zum Vertidisan®-Therapiebericht

Zusammengestellt von Prof. Dr. med. H.P. Zenner

Fragebogen 1.0 (CGI-I, Global Index of Improvement)

Der CGI-I bewertet die Krankheits-Veränderung gegenüber dem Beginn der Behandlung

1=sehr viel besser seit Beginn der Behandlung; 2=viel besser; 3=geringfügig besser; 4=keine Veränderung gegenüber dem Ausgangswert (dem Beginn der Behandlung); 5=geringfügig schlechter; 6=viel schlechter; 7=sehr viel schlechter seit Beginn der Behandlung.

(Literatur: Min et al 2021: Predictors of treatment response to pharmacotherapy in patients with persistent postural–perceptual dizziness. J. Neurol. 268, 2523–2532. Bjelic-Radisic et al. 2017: Neurourology and Urodynamics 37, 1365-1371).

Fragebogen 1.1 (CGI-S Global Index of Improvement)

Der CGI-S bewertet den aktuellen Krankheits-Status (Schweregrad,

1=normal; 2=grenzwertig krank; 3=leicht krank; 4=mäßig krank; 5=stark krank; 6=schwer krank; 7=extrem krank.

(Literatur: Min et al 2021: Predictors of treatment response to pharmacotherapy in patients with persistent postural–perceptual dizziness. J. Neurol. 268, 2523–2532. Bjelic-Radisic et al. 2017: Neurourology and Urodynamics 37, 1365-1371).

Fragebogen 1.2 (DHI Dizziness Handicap Inventory)

Misst die Schwindelbelastung

0: Keine Belastung, 100: maximale Belastung durch den Schwindel.

Drei Unterskalen: braun: emotionale Belastung, rot: Behinderung im Alltag, orange: Schwindelauslösung durch Körperbewegungen.

(Literatur: Volz-Sidiropoulou et al. 2010: Das „Dizziness Handicap Inventory“: Erste psychometrische Kennwerte einer Deutschen Version. Laryngorhinootologie 89, 418-423.)

Fragebogen 1.3 kurz (VSS-sf-VER, Vertigo Symptom Score)

Misst die Schwindelintensität

0: Kein Schwindel, 32: maximale Intensität.

(Literatur: Gloor-Juzi et al 2012: Translation and validation of the vertigo symptom scale into German. BMC Ear, Nose and Throat Disorders 12, 7). Kondo et al: Analysis of vestibular-balancesymptoms according to symptomduration: dimensionality of the VertigoSymptom Scale-short form. Health and Quality of Life Outcomes 13, 4 (2015)

Fragebogen 1.3 lang (VSS, Vertigo Symptom Score)

Misst die Schwindelintensität

0: Kein Schwindel, 88: maximale Intensität.

(Literatur: Gloor-Juzi et al 2012: Translation and validation of the vertigo symptom scale into German. BMC Ear, Nose and Throat Disorders 12, 7)

Fragebogen 1.4 (Sturzfragebogen)

Misst Stürze und Sturzneigung

0: Kein Sturz oder Sturzneigung; 1: Sturzneigung; 2-3: Sturzrettung (Sitzen, Liegen); 4 und mehr: Sturz

(Wirth et al 2023: Klinikum r.d. Isar, Technische Universität München)
